Pasta boli Spirig HC®

¦? *SPIRIG HEALTHCARE*

Composition
1 g de pâte contient 2 mg d'acide salicylique et des excipients.

Indications/Possibilités d'emploi
Traitement externe du rhumatisme musculaire et articulaire, des contusions, foulures, bursites et tendinites.

Posologie/Mode d'emploi
Adultes et adolescents à partir de 12 ans
En cataplasme froid: lors de piqûres d'insectes et de foulures.

En cataplasme chaud: lors de refroidissements, en cas de mal de gorge, de contusions, de luxations, de déchirements, de douleurs articulaires et musculaires.

Malaxer brièvement le tube avant d'appliquer la pâte directement sur la peau ou après l'avoir laissée chauffer pendant dix minutes dans l'eau chaude, non bouillante, recouvrir d'un tissu et laisser agir (appliquer 1 à 2 fois par jour). La pâte ne doit pas être chauffée dans le four à micro-ondes!

Enfants à partir de 2 ans

Chez les enfants (à partir de 2 ans) Pasta boli Spirig HC doit être utilisé seulement à court terme et sur une petite surface.

Contre-indications
Hypersensibilité connue à l'un des composants, lésions de la peau et enfants de moins de 2 ans.

Mises en garde et précautions
Chez des enfants à partir de 2 ans et des patients avec des maladies rénales utiliser le produit seulement à court terme et sur une petite surface.

Grossesse/Allaitement
Pendant la grossesse et l'allaitement Pasta boli Spirig HC doit être utilisé seulement à court terme, sur une petite surface et seulement après consultation du médecin.

Effets indésirables
Utilisé conformément, aucun effet secondaire n'a été constaté à ce jour.

Numéro d'autorisation
34040 (Swissmedic).

Titulaire de l'autorisation
Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Mise à jour de l'information
Juillet 2012.

Présentations

	Quantité	CHF	Cat. de remise	Cat. de rem-boursement	
PASTA BOLI Spirig HC (ec 06/13)	tube 400 g (ec 06/13)		D		

Publiziert am 16.10.2012